ORIGINAL ARTICLE

임상검사와 정도관리

Journal of
LABORATORY / and
MEDICINE / QUALITY
ASSURANCE

Evaluation of the Effectiveness of NK Vue Gold Kit in Patients with Chronic Hepatitis B

Young Ae Lim¹, Soon Sun Kim², Sung Won Cho², and Jae Youn Cheong²

Departments of
¹Laboratory Medicine
and ²Gastroenterology,
Ajou University School of
Medicine, Suwon, Korea

Corresponding author:

Young Ae Lim
Department of Laboratory
Medicine, Ajou University
Hospital, Ajou University School
of Medicine, 164 World cup-ro,
Yeongtong-gu, Suwon 16499,
Korea
Tel: +82-31-219-5786
Fax: +82-31-219-5778
E-mail: limyoung@ajou.ac.kr

pISSN: 2384-2458
eISSN: 2288-7261

Background: The associations between hepatitis B virus (HBV) infection and natural killer cell activity (NKA) have been studied. However, there have been no studies on detection of NKA in HBV patients using NK Vue Gold kit (ATGen Co., Korea), which has been developed in Korea and can easily detect NKA in whole blood.

Methods: A patient group of 40 patients diagnosed with hepatitis B antigen-positive chronic hepatitis B and a control group of 40 people eligible for blood donation were selected for this study. Whole blood (1 mL) was collected in special tubes for analysis with NK Vue Gold kit. The concentration of interferon- γ (IFN- γ) was measured and considered to represent NKA.

Results: There was no significant difference in the median (value, range) of concentration of IFN- γ between the patient (2,000, 89–2,000 pg/mL) and control groups (1,786, 333–2,000 pg/mL). The concentration of IFN- γ was inversely correlated with leukocyte count in both patient ($r=-0.390$, $P=0.022$) and control ($r=-0.339$, $P=0.032$) groups. The concentration of IFN- γ in the patient group was inversely correlated with concentrations of alanine aminotransferase ($r=-0.363$, $P=0.021$), aspartate aminotransferase ($r=-0.336$, $P=0.037$), and bilirubin ($r=-0.376$, $P=0.020$).

Conclusions: There was no significant difference in NKA between the patient and control group. Caution should be practiced when interpreting results of NKA, because leukocyte count can affect concentration of IFN- γ .

(J Lab Med Qual Assur 2016;38:151-158)

Key Words: Natural killer cells, Hepatitis B virus, Interferon-gamma

서론

Natural killer (NK)세포는 혈액 내 존재하는 자연 살해세포라 불리는 백혈구의 일종으로 말초혈액 림프구의 10%~15%를 차지한다. 이들은 다양한 종양세포와 일부 바이러스 감염된 세포에 대하여 세포독성을 나타낸다. NK세포가 생성하는 interferon (IFN)- γ 는 큰 포식세포를 활성화하여 탐식된 병원균을 죽이도록 유도하며 interleukin-12 생성을 유도한다[1]. NK세포는 질병이 발생하지 않으면 개인에서 일생 동안 일정한 활성도를 보이는 것으로 되어 있으나[2], 취침, 운동, 음식

물, 스트레스 및 기타 감염이나 질병에 따라 영향을 받는 것으로 되어 있다. NK세포 활성도는 종양 병기와 음성적 연관성이 있으며[3,4], 높은 수술 후 5년 생존율은 NK세포 활성도와 관련이 있는 것으로 보고되어 있다[5]. 이와 같이 NK세포 활성도 저하는 종양과의 연관성뿐만 아니라, 최근에는 C형간염[6], human immunodeficiency virus 감염[7] 및 B형간염과의[8] 연관성도 보고되고 있다.

NK세포의 활성도 측정법의 gold standard로 chromium 51 release assay가 있으나[9] 방사선동위원소를 사용하여야 하는 여러 가지 제약이 있으며, CD107a degranulation assay,

NK세포로부터 분리되는 IFN- γ 를 측정하는 ELISA, IFN- γ 의 세포 내 염색은 모두 전혈로부터 NK세포를 분리하여야 하므로 번거로우며 다량의 혈액이 필요하다는 단점이 있다. 반면 최근 국내에서 개발된 NK Vue Gold kit (NK Vue Gold: ATGen Co., Seongnam, Korea) 제품은 전혈에서 NK세포 분리 없이 소량의 혈액으로 NK세포로부터 분리되는 IFN- γ 를 측정하여 활성도를 간편하게 측정할 수 있는 방법이다[10].

현재 국내에는 NK Vue Gold kit을 이용하여 여러 가지 다양한 중앙 환자와의 관계에 대한 연구는 진행되고 있으나, 아직 B형간염 환자에 대한 NK세포 활성도에 대한 연구는 없는 실정이다. 이에 본 연구는 국내 유병률이 높은 만성B형간염 환자의 진료 시 NK세포 활성도 측정이 예후 판정에 도움을 줄 수 있는지 여부와 NK Vue Gold의 성능을 평가하고자 하였다.

재료 및 방법

1. 대상

연구는 기관연구윤리심의를 득한 후 시행하였다(AJIRB-DEV-DE1-14-147). 연구대상은 환자군 40명과 대조군 40명으로 이들의 혈액 검체는 전용 용기인 Promoca-Gold tube (NK Vue Gold)에 1 mL의 전혈을 채혈하였다.

환자군은 6개월 이상 hepatitis B surface antigen (HBsAg) 양성인 만성B형간염으로 혈액검사 당시 모두 항바이러스제 치료를 받지 않는 환자였다. 2015 대한간학회 만성B형간염 진료 가이드라인에 따라 환자의 hepatitis B e antigen (HBeAg), hepatitis B e antibody (anti-HBe), hepatitis B virus (HBV) DNA, alanine aminotransferase (ALT) 값을 기준으로 면역활동기, 면역탈출기, 면역관용기 및 면역비활동기(inactive carrier)로 구분하였다.

대조군은 최근 1년 이내 실시한 건강검진항목 중 빈혈이 없으며, B형과 C형간염검사상 음성, ALT 65 IU/L 미만으로 일주일 이내 특이 증상이나 복용하는 약물이 없는 헌혈자 선별기준에 적합한 20세 이상의 성인 40명을 대조군으로 하였다. 약물로는 NK세포 활성도에 영향을 줄 수 있는 항소염제, 항생제, cholesterol 강하제, 진통제, 스테로이드, 알코올, 항암제, omeprazole 등으로 정의하였다.

2. Interferon- γ 측정

NK Vue Gold kit (ATGen Co.)의 IFN- γ 측정은 제조사 설명서대로 검사를 시행하였다. 채혈한 전혈을 전용 용기인 Promoca-Gold 튜브 안쪽 면에 코팅된 NK세포 활성 물질과 혼합되도록 한 후 채혈 즉시, 늦어도 최대 4시간 이내에 37°C

배양기에서 20-24시간 세워서 배양하였다. 배양 후 원심분리 후 상층액을 300-400 μ L 취한 후 NK세포 활성도 측정까지 -70°C 냉동고에 보관하였다. 표준액은 최종 농도가 4,000 pg/mL로 제조된 표준액을 2,000 pg/mL, 500 pg/mL, 125 pg/mL, 0-blank로 희석한 4가지 농도로부터 표준곡선을 생성한 후 결과를 계산하여 얻었다. 표준액의 최고 농도가 2,000 pg/mL이라 이 이상을 보이는 수치는 모두 2,000 pg/mL로 간주하였다. 따라서 IFN- γ 의 구간별 비교도 시행하였는데, 참고치인 250 pg/mL 미만, 250-999 pg/mL, 1,000-1,999 pg/mL, 그리고 2,000 pg/mL 이상의 4구간으로 구분하여 분석해 보았다.

ELISA 검사는 매회 검사 시마다 수집된 환자군과 대조군 검체를 포함하게 하여 4회에 걸쳐 시행하였다. 제품 내 2가지 수준의 대조물질을 검사마다 시행하여 검사 간과 검사일 간의 변이계수(coefficient of variation, CV)와 이중으로 실시한 검체의 CV도 구하였다. 해동된 검체는 검사기간인 2-3일 동안은 냉장보관 후 다시 -70°C 냉동보관하였다.

Promoca-Gold tube에 채혈되어 검사 후 냉동보관된 검체 중 검체량이 충분한 38개의(대조군 22개, 환자군 16개) 검체에서 Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit (R&D systems, Minneapolis, MN, USA)를 이용하여 제조사 설명서대로 IFN- γ 를 측정하였다. Quantikine ELISA Kit의 표준액 상한치는 1,000 pg/mL라 NK Vue Gold kit으로 측정할 IFN- γ 의 수치가 1,000 pg/mL 이하였던 20개의 검체는 원액대로, 1,001-2,000 pg/mL 사이의 값을 보였던 18개의 검체는 미리 전용 희석액으로 2배 희석하여 검사를 진행한 후 산출값에 2배를 곱하여 최종값을 산정하였다. 표준액은 최종 농도가 1,000 pg/mL로 제조된 표준액을 500 pg/mL, 250 pg/mL, 125 pg/mL, 62.5 pg/mL, 31.2 pg/mL, 15.6 pg/mL로 희석한 6가지 농도로부터 표준곡선을 생성한 후 결과를 계산하여 얻었다.

3. 환자 및 대조군 선별검사

모든 대조군은 선별을 위하여 haemoglobin (Hb), 백혈구 수, 림프구 백분율, 림프구 절대수[(백혈구 수 $\times$ 림프구 백분율)/100], ALT, hepatitis C antibody (anti-HCV), anti-HIV와 HBsAg을 실시하였다. 환자군은 Hb, 백혈구 수, 림프구 백분율, 림프구 절대수, ALT, aspartate aminotransferase (AST), 총 빌리루빈, HBeAg, anti-HBe와 HBV DNA level이 측정된 경우 그 결과값을 이용하여 분석하였다. Hb, 백혈구 수와 림프구 백분율은 LH 780와 750 (Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA), ALT, AST와 총 빌리루빈은 TBA-200FR (Toshiba, Tokyo, Japan) 장비와 Denka

Seiken사(Tokyo, Japan)의 시약을 이용하되 총 빌리루빈은 Wako사(Osaka, Japan)의 시약을 이용하여 측정하였다. 대조군의 선별검사 시 anti-HCV는 Genedia HCV ELISA 3.0 (Greencross, Yongin, Korea), anti-HIV와 HBsAg는 Architect i1000 (Abbott Laboratories, Abbot Park, IL, USA)로 측정하였다. 환자군의 HBsAg, HBeAg와 anti-HBe는 핵의학검사인 radioimmunoassay kit (Abbott Laboratories), HBV DNA level은 Cobas TaqMan HBV Test ver. 2.0 (Roche molecular diagnostics, Pleasanton, CA, USA)를 이용하여 측정하였는데, $>1.7 \times 10^8$ IU/mL은 1.7×10^8 IU/mL로 간주하였고, 결과 분석 시는 $\log_{10}$ 를 취한 결과값을 이용하였다. 환자군의 경우 2-6개월 후 추적검사가 가능한 이들에게서 HBV DNA level 추적검사결과와 추후 경구 항바이러스제 복용 여부를 조사하였다.

4. 통계처리

자료는 SPSS ver. 12.0 for window (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)와 Excel 2010 (Microsoft, Redmond, WA, USA)을 이용하였다. 정규분포검정은 Kolmogorov-Smirnov test를 시행하여 결과값이 정규분포를 보이면 평균±표준편차, 정규분포가 아니면 중앙값(범위)로 나타내었다. 대조군과 환자군의 비교 시 두 군 간의 결과값 비교는 Student t-test 혹은 Mann-Whitney test를 실시하였고, 환자군 내의 두 군 이상 비교 시는 Kruskal-Wallis test를 이용하였다. 성별 및 IFN- γ 의 4개 군간별 비교 시는 chi-square test(혹은 Fisher's exact test)를 이용하였다. 동일 검체에 대하여 두 가지 ELISA 제품의 IFN- γ 비교 시는 paired t-test로 평균값을 비교하였다. 상관성은 Pearson's correlation를 실시하였는데, 검체 수가 적을 것으로 예상되는 환자군 간의 비교 시는 Spearman's correlation도 함께 구하여 두 가지 상관관계수에서 모두 유의한 경우에만 유의한 것으로 간주하였다. $P<0.05$ 인 경우에만 통계학적으로 의의가 있는 것으로 간주하였다.

결과

1. 대상군 특징

환자군(대조군)의 평균 연령은 42.9 ± 10.9 세(30.9 ± 9.0 세), 남성:여성 비율 23:17 (12:28)이었으며 평균 Hb 14.3 ± 1.5 (13.5 ± 1.1) g/dL로 대조군에 비하여 유의하게 높았다(Table 1). 정상군 IFN- γ 의 중앙값(범위)는 남성 1,802 (877-2,000) pg/mL 여성 1,786 (333-2,000) pg/mL로 성별 간에 유의한 차이는 없었다($P=0.422$).

2. NK Vue Gold kit의 성능 평가

NK Vue Gold kit로 4회 검사 시의 고수준 대조물질(≥ 800 pg/mL)과 저수준 대조물질(≤ 300 pg/mL)의 검사 간 평균(범위) CV%는 각각 1.7% (1.2%-2.8%)와 1.2% (0%-3.1%)이었으며, 검사일 간 평균 CV는 각각 3.1%와 2.1%로 우수하였다. 이중으로 실시한 환자와 대조군 중 2,000 pg/mL 이하인 39개 검체의 CV는 0.1%-11.5%로 10% 이상이 2개 있었으나 평균 CV는 3.5%로 우수하였다. 두 가지 제품 비교가 가능하였던 38개의 보관 검체에서 시행한 IFN- γ 평균은 NK Vue Gold kit $1,012.1 \pm 518.3$ pg/mL으로 Quantikine ELISA $1,389.8 \pm 789.6$ pg/mL보다 유의하게 낮았으나($P<0.001$), Pearson 상관계수는 $r=0.903$ ($P<0.001$)로 매우 우수한 상관관계를 보였다(Fig. 1).

3. 환자군과 대조군의 NK세포 활성도

NK세포 활성도는 NK Vue Gold kit로 측정한 IFN- γ 로 간주하였다. IFN- γ 의 중앙값(범위)는 환자군 2,000 (89-2,000) pg/mL으로 대조군 1,786 (333-2,000) pg/mL과 유의한 차이는 없었다($P=0.549$). 제조사에서 제공한 정상인의 참고치인 250 pg/mL 미만의 값을 보였던 경우 환자군은 89 pg/mL, 121 pg/mL, 214 pg/mL로 3명으로 면역탈출기 2명과 면역활동기 1명으로 $4.0 \log_{10}$ IU/mL 이상의 HBV DNA 수치를 보

Table 1. Baseline characteristics of patient and control groups

Parameter	Patients (n=40)	Controls (n=40)	P-value
Age (yr)	42.9 ± 10.9	30.9 ± 9.0	<0.001
Gender (male:female)	23:17	12:28	0.013
Alanine aminotransferase (U/L)	65 (8-997)*	13 (8-47)	<0.001
Haemoglobin (g/dL)	14.3 ± 1.5	13.5 ± 1.1	0.008
White blood cell count ($\times 10^9$ /L)	5.8 ± 1.8	6.0 ± 1.7	0.569
Lymphocyte (%)	35.3 ± 10.8	31.9 ± 6.7	0.107

Values are presented as mean±standard deviation.

*Except for ALT.

였으나 대조군은 가장 낮은 수치가 333 pg/mL로 참고치 미만
을 보였던 경우는 없었다. IFN- γ 의 4개 구간별 구분 시 환자군
과 대조군은 유의한 차이가 없었으며, 환자군인 면역활동기,
면역탈출기, 면역관용기 및 면역비활동기(inactive carrier)
의 4개 군 사이에서도 IFN- γ 은 유의한 차이는 없었다(Fig. 2,
Table 2).

환자군의 간기능 수치와 IFN- γ 수치와의 상관계수는 ALT
 $r=-0.363$ ($P=0.021$), AST $r=-0.336$ ($P=0.037$), 빌리루
빈 $r=-0.376$ ($P=0.020$)으로 모두 유의한 음의 관계를 보였
다. 4개의 환자군에서 각각 분석 시에는 면역비활동기군에서
만 AST와 IFN- γ 수치는 Pearson과 Spearman 상관계수가
각각 -0.672 ($P=0.047$)와 -0.767 ($P=0.016$)로 모두 유의하
였다. 또한 환자군의 IFN- γ 수치는 백혈구 수와 $r=-0.390$

($P=0.022$)로 유의한 음의 상관관계를 보였으나, 연령, HBV
DNA, Hb, 그리고 림프구 백분율 및 절대수치는 상관관계를
보이지 않았다. 대조군의 IFN- γ 수치는 백혈구 수 $r=-0.339$
($P=0.032$) (Fig. 3), 림프구 백분율 $r=0.601$ ($P<0.001$)로
유의한 상관관계를 보였으나, 연령, ALT, Hb, 그리고 림프구
절대수치는 상관관계를 보이지 않았다.

Fig. 1. Significant correlation ($r=0.903$, $P<0.001$) between interferon-gamma secreted from activated natural killer cells measured by NK Vue Gold kit (ATGen Co., Korea) and Quantikine ELISA (R&D systems, USA).

Fig. 2. Distribution of concentrations of IFN- γ (pg/mL) secreted by activated natural killer cells in controls (rhombus, $n=40$) and patients (circle, $n=40$). There was no significant difference in IFN- γ concentration between controls and patients ($P=0.904$). More than 2,000 pg/mL INF- γ was taken as 2,000 pg/mL, because of the upper limit of analytical measurable range of undiluted samples. Abbreviations: IFN- γ , interferon-gamma; IT, patients in immune-tolerant phase; Carrier, inactive carrier; HBeAg, hepatitis B e antigen; HBeAg(-), patients in immune-escape phase; HBeAg(+), patients in immune-active phase.

Table 2. Number of controls and patients based on concentration of interferon- γ and type of patient group

	N	Interferon- γ (pg/mL)			
		<250	251-999	1,000-1,999	>2,000
Control	40	0	8	14	18
Patient	40	3	8	6	23
Carrier	10	0	3	2	5
IT	5	0	2	1	2
HBeAg (-)	11	2	1	1	7
HBeAg (+)	14	1	2	2	9

There were no significant differences between control and patient groups and between carrier, IT, HBeAg (-), and HBeAg (+) groups, according to Fisher's exact test.

Abbreviations: Carrier, inactive carrier; IT, immune-tolerant phase; HBeAg, hepatitis B e antigen; HBeAg (-), HBeAg-negative chronic hepatitis B; HBeAg (+), HBeAg-positive chronic hepatitis B.

Fig. 3. Correlation between concentration of IFN- γ , secreted from activated natural killer cells, and WBC count in patients (n=40) and controls (n=40). There was significant correlation between the two factors, in both (A) patients ($r=-0.390$, $P=0.022$) and (B) controls ($r=-0.339$, $P=0.032$). Abbreviations: IFN- γ , interferon-gamma; WBC, white blood cell.

4. 환자군의 추적검사

환자군은 NK세포 활성화검사 후에 경구 항바이러스제 치료를 시작하였는데 치료군인 그룹 1은 면역활동기(HBeAg 양성) 14명과 면역탈출기(HBeAg 음성) 11명 중 7명을 제외한 18명이었으며, 비치료군인 그룹 2는 면역관용기 5명, 면역비활동기 10명과 그룹 1에서 항바이러스제 약물의 건강보험 요양급여기준에 해당하지 않은 7명의 환자가 포함된 22명이었다. NK세포 활성도가 HBV DNA level과 ALT 변화를 예측할 수 있는 인자로 알아보기 위하여 초기 NK세포 활성도와 HBV DNA level 및 ALT 변화와의 관련성을 조사하였다.

NK세포 활성화 측정 후 2-6개월 후에 HBV DNA level 검사와 ALT를 시행한 환자는 그룹 1이 18명과 그룹 2는 10명이었다. 두 군 모두에서 초기 NK세포 활성도는 HBV DNA level 변화량과 ALT 변화량과의 상관성은 보이지 않았다.

고찰

국내에서 개발된 NK Vue Gold kit는 NK Vue kit의 개선된 시약으로 전혈에서 소량의 혈액으로 활성화된 NK세포로부터 분비되는 IFN- γ 를 측정하여 NK세포 활성도를 간편하게 측정할 수 있는 방법이다. 이 시약은 말초혈액에서 단백질을 별도로 분리하지 않고 측정하는데, 전혈을 전용 용기 내 함유된 PROMOCA 자극 시 분비되는 IFN- γ 는 CD3-CD56+ NK세포에서 50% 이상, CD3+ T 림프구와 NKT세포에서 30% 정도 분비하는 것으로 보고되고 있다[10]. NKT세포는 T 림프구 수용체와 NK세포의 특성 일부를 함께 가지고 있으며, 활성화 시 염증반응 및 세포독성 T 림프구의 발생과 증폭뿐만이 아니

라 B 림프구의 항체 생산을 촉진하는 사이토카인을 신속하게 다량으로 분비할 수 있다. 따라서 NKT세포는 NK세포와 더불어 자연면역기능을 대변해 주므로 NK Vue kit로 NK세포 활성화 측정 시 함께 측정되어도 무리가 없다고 볼 수 있다.

NK세포는 일반혈액검사 시 림프구로 산정되므로 본 연구에서는 림프구 백분율이나 절대수와의 연관성도 조사하였다. 본 연구에서 측정한 NK세포 활성도는 대조군뿐만이 아니라 환자군에서 백혈구 수와는 음의 상관관계를 보였으나, 림프구 백분율이나 절대수와는 연관성이 없었다. Transforming growth factor (TGF)- β 는 NK세포 기능을 방해하는데[10,11], 전혈 내 apoptotic 백혈구로부터 유래되는 것으로 되어있다[12,13]. 따라서 본 연구에서 NK세포 활성도가 백혈구 총수와 음의 상관관계를 보인 것은 배양 중 전용 용기 내 백혈구로부터 유래된 TGF- β 가 NK세포로부터 분비되는 IFN- γ 양을 방해하는 것과 관련이 있는 것으로 추측된다.

본 연구의 대조군 평균값은 1,505.8 pg/mL으로 정상인 867.5 $\pm$ 50.2 pg/mL로 보고한 Lee 등[10]의 보고에 비하여 더 높았는데 2,000 pg/mL 이상을 보인 수치에 대하여 더 회석을 하지 않고 2,000 pg/mL로 간주한 것까지 고려하면 실질적인 평균값은 이보다 더 높을 것으로 예측할 수 있다. 이러한 차이는 기관 간의 차이도 있겠지만, NK Vue kit가 NK Vue Gold kit로 개선되고 전용 용기의 NK세포 활성화 물질도 액체형에서 시험관의 coating형으로 바뀌면서 민감하게 반응하기 때문인 것으로 여겨진다. 다만 액체형이 아니므로 검사자들은 검체 채혈 후 검체 혼입에 좀 더 신경을 쓸 필요가 있을 것으로 보여진다. 따라서 NK Vue Gold kit 참고치 설정 시 NK Vue kit와는 별도로 설정하는 것이 검사실에 도움이 될 것으

로 판단된다.

본 연구에서는 검사 간과 검사일 간의 변이를 반영하기 위하여 4회에 걸쳐 검사를 나누어 시행하였으며, 환자군과 대조군이 검사일 간을 달리하여 발생할 수 있는 변이를 최소화하기 위하여 매 검사 시마다 환자군과 대조군을 유사한 비율로 함께 검사를 시행하였다. 검사 간 및 검사일 간 평균 CV%는 모두 3.1% 이하로 우수한 것으로 평가되었으므로 동일 환자의 추적 검사 시에도 용이하게 사용될 수 있을 것으로 여겨진다.

38개의 보관 검체에서 측정된 IFN- γ 값은 타사의 ELISA와 우수한 상관성을 보였으나 NK Vue Gold kit로 측정된 값이 타사 ELISA로 측정된 값보다 유의하게 낮게 측정되는 것으로 나타났다. 물론 검체 보관조건이 동일하지 않으며, 타사의 제품은 일회만 검사를 시행하였으므로 정확한 비교는 어렵다고 할 수 있다. 그러나 NK Vue Gold kit 제품 측정 후 재냉동과 해동을 거친 후 타사의 제품을 측정하였다는 점을 감안한다면 낮게 측정된다는 사유를 검토할 필요는 있을 것으로 보여진다.

현재 NK Vue Gold kit 제품의 표준액은 4,000 pg/mL을 희석 후 2,000 pg/mL부터 2단계 계단 희석하여 500 pg/mL, 125 pg/mL, 0 pg/mL로 희석한 4가지 농도만 제공하여 표준 곡선을 작성한다. 이러한 점은 500-15.6 pg/mL까지 6개의 농도를 제공하는 타사의 ELISA 제품에 비하여 NK세포 활성도가 정상인에 비하여 저하되었는지를 평가하기에는 cut-off 수치 근처의 표준액 농도 종류가 적어 정확히 평가하기는 불리할 것으로 보여진다. 저하된 NK세포 활성도는 암발생의 위험이 높아진다는 보고가 있으므로[14], 건강검진 환자에서 선별검 사용으로 사용되기 위해서는 cut-off 수치 근처의 표준액 농도의 종류를 증가하는 것이 필요할 것으로 생각된다. 또한 두 제품의 비교는 NK Vue Gold kit 제품에서 2,000 pg/mL 이하의 농도를 보인 검체에서만 비교하였기 때문에 이러한 표준액 농도의 종류와 수의 차이에 의하여 두 제품 간의 수치에 더 많은 차이를 보일 수 있을 것으로 생각된다.

NK세포는 HBV 감염의 주 면역반응을 나타내는 것으로 되어 있다. 급성B형간염 환자에서 NK세포 활성도가 높은 환자 들은 HBV 제거능력이 좋으며 간손상과 관련이 있어 ALT 수치 증가와 관련이 있으며, DNA 수치와는 반비례하는 것으로 보고되었다[15]. 또한 B형간염 환자 중 면역활동기에 있는 환자가 면역관용기에 있는 환자나 정상 대조군에 비하여 NK세포 활성도가 증가되었다는 보고도 있다[16]. 반면 본 연구의 환자군인 만성B형간염에서 IFN- γ 수치는 간기능과 관련 있는 ALT, AST, 빌리루빈과 음의 상관관계를 보였다. 이는 만성B형간염 환자에서 NK세포의 perforin, granzyme B, granulysin의 표현이 비정상 간기능을 가진 환자가 정상 간기

능을 가진 환자보다 더 낮았다는 사실과 관련이 있는 것으로 보여진다[17]. 만성B형간염 중 높은 DNA 수치를 보이는 환자에서 NK세포의 IFN- γ 는 정상인에 비하여 감소되었다고 보고하였으나[17], 본 연구에서는 환자군과 대조군에서 IFN- γ 의 값의 유의한 차이는 없었고, 면역활동기, 면역탈출기, 면역관용기 및 면역비활동기 환자군 간에도 IFN- γ 의 값은 유의한 차이는 없어서 환자군을 진단하는데 IFN- γ 가 별 도움을 주지 못할 것으로 여겨졌다.

그러나 대조군에서는 333 pg/mL이 가장 낮은 값을 보인 반면 환자군에서 참고치 250 pg/mL 미만을 보였던 환자가 3명이나 있으므로 일부의 만성B형간염 환자에서 보여지는 감소된 NK세포 활성도에 대한 임상적 의미는 추후 더 확인돼야 할 것으로 여겨진다. 즉 이 환자들의 NK세포 활성도는 만성B형간염 전부터 원래 낮았는지 혹은 감염 후 낮아진 것인지, 왜 일부 환자에서만 NK세포 활성도가 저하되었는지에 대한 부분이다.

본 연구에서는 약물 치료군과 비치료군 모두에서 초기 NK세포 활성도는 HBV DNA level과 ALT 추적검사를 예측하는데 별 도움을 주지 못할 것으로 여겨졌다. 그러나 이는 비치료군 중 추적관찰이 가능한 환자가 10명으로 적었기 때문인 영향도 완전 배제할 수 없으므로 이러한 가능성은 좀 더 많은 수의 환자를 대상으로 추가 연구하여 확인할 필요가 있을 것으로 생각된다. 또한 만성B형간염 환자에서 경구항바이러스제 치료 후 NK세포의 IFN- γ 의 생성능력에 영향을 끼치는지에 대해서는 추적관찰 후 NK세포의 값을 측정하지 않아 살펴볼 수 없었다. 이 역시 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각된다.

결론적으로 NK Vue Gold kit로 만성B형간염 환자에서 측정한 NK세포 활성도는 대조군과 유의한 차이는 없었다. 그러나 NK세포 활성도는 간기능을 나타내는 ALT, AST, 빌리루빈과 음의 상관관계가 있으며, 결과 해석 시 IFN- γ 수치는 백혈구 수에 따라 영향을 받을 수 있음을 유념할 필요가 있겠다.

감사의 글

This study was supported by a grant of the ATGen Corporation, Republic of Korea (M-2014-C1539-00001).

REFERENCES

1. McPherson RA, Massey HD. Overview of the immune system and immunologic disorders. In: McPherson RA, Pincus MR, Henry JB, editor. Henry's clinical diagnosis

- and management by laboratory methods. 22nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2011:846.
2. Whiteside TL, Friberg D. Natural killer cells and natural killer cell activity in chronic fatigue syndrome. *Am J Med* 1998;105:27S-34S.
 3. Konjevic G, Spuzic I. Stage dependence of NK cell activity and its modulation by interleukin 2 in patients with breast cancer. *Neoplasma* 1993;40:81-5.
 4. Tarle M, Kraljic I, Kastelan M. Comparison between NK cell activity and prostate cancer stage and grade in untreated patients: correlation with tumor markers and hormonal serotest data. *Urol Res* 1993;21:17-21.
 5. Takeuchi H, Maehara Y, Tokunaga E, Koga T, Kakeji Y, Sugimachi K. Prognostic significance of natural killer cell activity in patients with gastric carcinoma: a multivariate analysis. *Am J Gastroenterol* 2001;96:574-8.
 6. Corado J, Toro F, Rivera H, Bianco NE, Deibis L, De Sanctis JB. Impairment of natural killer (NK) cytotoxic activity in hepatitis C virus (HCV) infection. *Clin Exp Immunol* 1997;109:451-7.
 7. Kottlilil S, Chun TW, Moir S, Liu S, McLaughlin M, Hallahan CW, et al. Innate immunity in human immunodeficiency virus infection: effect of viremia on natural killer cell function. *J Infect Dis* 2003;187:1038-45.
 8. Shabani Z, Bagheri M, Zare-Bidaki M, Hassanshahi G, Arababadi MK, Mohammadi Nejad M, et al. NK cells in hepatitis B virus infection: a potent target for immunotherapy. *Arch Virol* 2014;159:1555-65.
 9. Brunner KT, Mauel J, Cerottini JC, Chapuis B. Quantitative assay of the lytic action of immune lymphoid cells on 51-Cr-labelled allogeneic target cells in vitro; inhibition by isoantibody and by drugs. *Immunology* 1968;14:181-96.
 10. Lee SB, Cha J, Kim IK, Yoon JC, Lee HJ, Park SW, et al. A high-throughput assay of NK cell activity in whole blood and its clinical application. *Biochem Biophys Res Commun* 2014;445:584-90.
 11. Flavell RA, Sanjabi S, Wrzesinski SH, Licona-Limon P. The polarization of immune cells in the tumour environment by TGFbeta. *Nat Rev Immunol* 2010;10:554-67.
 12. Chen W, Frank ME, Jin W, Wahl SM. TGF-beta released by apoptotic T cells contributes to an immunosuppressive milieu. *Immunity* 2001;14:715-25.
 13. Vallion R, Bonnefoy F, Daoui A, Vieille L, Tiberghien P, Saas P, et al. Transforming growth factor- β released by apoptotic white blood cells during red blood cell storage promotes transfusion-induced alloimmunomodulation. *Transfusion* 2015;55:1721-35.
 14. Imai K, Matsuyama S, Miyake S, Suga K, Nakachi K. Natural cytotoxic activity of peripheral-blood lymphocytes and cancer incidence: an 11-year follow-up study of a general population. *Lancet* 2000;356:1795-9.
 15. Zhao J, Li Y, Jin L, Zhang S, Fan R, Sun Y, et al. Natural killer cells are characterized by the concomitantly increased interferon- γ and cytotoxicity in acute resolved hepatitis B patients. *PLoS One* 2012;7:e49135.
 16. Zheng Q, Zhu YY, Chen J, Ye YB, Li JY, Liu YR, et al. Activated natural killer cells accelerate liver damage in patients with chronic hepatitis B virus infection. *Clin Exp Immunol* 2015;180:499-508.
 17. Li M, Yao Y, Gao YQ. Expression profile of immune effector molecules in natural killer cells in patients with chronic hepatitis B. *Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi* 2010;18:96-100.

만성B형간염 환자에서의 NK Vue Gold Kit 시약의 유효성 평가

임영애¹ • 김순선² • 조성원² • 정재연²

아주대학교 의과대학 ¹진단검사의학교실, ²소화기내과학교실

배경: B형간염과 natural killer (NK)세포의 연관성이 연구되고 있으나, 국내에서 개발되어 전혈에서 간편하게 NK세포의 활성도를 측정할 수 있는 NK Vue Gold kit (ATGen Co., Korea)를 이용하여 B형간염 환자에서 실시한 NK세포 활성도에 대한 연구는 없는 실정이다.

방법: 환자군은 hepatitis B surface antigen 양성 만성B형간염으로 진단받은 환자 40명, 대조군은 헌혈자 조건에 합당한 40명을 대조군으로 선정하였다. 이들의 전혈을 NK Vue Gold kit의 전용용기에 1 mL 채혈하고, interferon (IFN)- γ 농도를 측정하여 NK세포 활성도로 간주하였다.

결과: IFN- γ 의 중앙값(범위)은 환자군 2,000 (89-2,000) pg/mL으로 대조군 1,786 (333-2,000) pg/mL과 유의한 차이는 없었다. IFN- γ 농도와 백혈구 수는 환자군 $r=-0.390$ ($P=0.022$)과 대조군 $r=-0.339$ ($P=0.032$) 모두에서 상관관계를 보였다. 환자군에서 IFN- γ 수치는 alanine aminotransferase $r=-0.363$ ($P=0.021$), aspartate aminotransferase $r=-0.336$ ($P=0.037$), 빌리루빈 $r=-0.376$ ($P=0.020$)과 모두 유의한 음의 관계를 보였다.

결론: B형간염 환자의 NK세포 활성도는 대조군과 유의한 차이는 없었으며, NK세포 활성도의 결과 해석 시 백혈구 수가 IFN- γ 농도에 영향을 미칠 수 있음을 유념할 필요가 있겠다.

(J Lab Med Qual Assur 2016;38:151-158)

교신저자: 임영애

우)16499 수원시 영통구 월드컵로 164, 아주대학교 의과대학 아주대학교병원 진단검사의학과

Tel: 031)219-5786, Fax: 031)219-5778, E-mail: limyoung@ajou.ac.kr